



CITRUS VALLEY HEALTH PARTNERS
Citrus Valley Medical Center – Inter-Community Campus & Queen of the Valley Campus,
Foothill Presbyterian Hospital and Citrus Valley Hospice

INFLUENZA TESTING AND TREATMENT

Thank you for coming to the Emergency Department. We are happy to evaluate you.



If you have **flu symptoms**, please note that we are following recommendations from the CDC and Health Department regarding testing and treatment for influenza. The CDC and Health Department recommend treatment for the following patients only:

- **Children younger than 5 years old.** The risk for severe complications from seasonal flu is higher for children 2 or younger;
- **Pregnant women;**
- **Adults 65 years of age and older;**
- **Persons with the following conditions:**
 - Chronic breathing and heart problems (except high blood pressure); kidney, liver or blood disorders; brain, muscle or metabolic disorders;
 - Weakened immune system, including those caused by medications or HIV;
 - Persons younger than 19 years old who are receiving long-term aspirin therapy and who might be at risk for experiencing Reye syndrome after flu infection.

If none of the above categories applies to you, the CDC and Health Department do not recommend testing or purchasing Tamiflu.

PRUEBA Y TRATAMIENTO DE INFLUENZA

Gracias por venir al departamento de Emergencia. Nos da gusto evaluarlo/a.



Si tiene síntomas de influenza, por favor note que estamos haciendo las siguientes recomendaciones del CDC (Centro de Control de Enfermedad) y el Departamento de Salud acerca de la prueba y tratamiento de influenza. El CDC y Departamento de Salud recomiendan tratamiento solamente para los siguientes pacientes:

- **Niños menores de 5 años de edad.** El riesgo de complicaciones severas de la influenza de la temporada es más alta en los niños menores de 2 años;
- **Mujeres embarazadas;**
- **Adultos de 65 años o mayor;**
- **Personas con las siguientes condiciones:**
 - Problemas crónicos de respiración y del corazón (excepto presión alta): problemas de riñón, desorden de sangre o hígado; desorden metabólico o de muslo;
 - Sistema inmuno debilitado, incluyendo si es causado por medicamentos o VIH;
 - Personas menores de 19 años de edad quienes reciben terapia de aspirina continua y que pueden estar a riesgo del Síndrome de Rye después de ser infectadas con influenza.

Si ninguna de las categorías mencionadas arriba le aplican a usted, el CDC y Departamento de Salud no recomiendan la prueba ni la compra de Tamiflu.